

Consuelo Figueroa Luna, Amador Hernandez Hipolito, Manahen Bustamante Najera Eleazar.



INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS

Introducción: El presente trabajo de investigación denominado “Percepción de calidad de vida de los pacientes colostomizados del hospital general de, Tuxtepec, Oaxaca”, es una manera de conocer la percepción de vida del paciente tras la intervención, el personal de enfermería resolverá cualquier duda que haya podido surgir, y le enseñará cómo cuidar la colostomía y cómo cambiar la bolsa. Actualmente el profesional de enfermería está capacitado para los cuidados necesarios de esta patología. (EuroResidentes, 2012).

Objetivo: Conocer la percepción de la calidad de vida de los pacientes colostomizados del Hospital General, de Tuxtepec, Oaxaca, así como documentar la investigación con fuentes relevantes.

Material y Métodos: Tipo de diseño no experimental, transversal, tipo de estudio descriptivo, explicativo. Tipo de investigación, cuantitativo, de campo. El universo está formado por 30 pacientes con colostomía de los cuales se les aplicó un instrumento de 32 utilizando la escala de Montreux, acerca del estilo de vida. Mediante un muestreo no probabilístico incidental a pacientes con colostomía en el Hospital General de Tuxtepec.

Resultados: Del 100% solo el 60% manifestó que nunca se sienten tristes después de la colocación de su bolsa de colostomía, al 27% a veces les da por sentir tristeza y el 13% dijo que siempre están con un estado de ánimo triste.

TABLA NO. 10

10.- ¿Tengo miedo a que se complique mi estado de salud por mi colostomía?

INDICADOR	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Nunca	0	0%
b) A veces	6	40%
c) Siempre	9	60%
Total	15	100%

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes con colostomía del hospital general de Tuxtepec Oaxaca.

14.- ¿El haber sido Colostomizado me ha impedido trabajar?

INDICADOR	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Nunca	2	13%
b) A veces	7	47%
c) Siempre	6	40%
Total	15	100%

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes con colostomía del hospital general de Tuxtepec Oaxaca.

Conclusión: El estilo de vida de un paciente con colostomía si se ve afectada, si hay un cambio en todos sus patrones sociales, tanto emocionales hasta de pareja Del 100% el 25% de las personas nunca han tenido problemas durante el uso de la bolsa después de realizarse la colostomía, el 25% contestó que solo a veces y el 25% que siempre les han presentado problemas con el uso de la bolsa.

FUENTES DE INFORMACION

Tabla NO. 31

31.- Mi vida en el último mes de vida ha sido mala.

INDICADOR	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Nunca	9	60%
b) A veces	4	27%
c) Siempre	2	13%
Total	15	100%

Fuente: Instrumento aplicado a los pacientes con colostomía del hospital general de Tuxtepec Oaxaca.